

רפואה


בעריכת: נ. קצין

עמותת הפרקינסון מתריעה:

חולי פרקינסון מתים מבעיות בליעה בשל חוסר נגישות לטיפול

■ מעל 54% מהחולים נפטרים מדלקת ריאות על רקע קשיי בליעה ■ המצוקה העיקרית - אצל חולים בפריפריה בשל היעדר תשתית טיפולית מספקת ■

בבעיה העיקרית של קשיי דיבור, בעיות בליעה וחנק ואספירציה. "החולים מגיעים במצבים קשים למרפאות, בגלל הנסיעות הארוכות והמת-ישות למרכזים רפואיים רחוקים. חייבות להיות מרפאות שידועות לטפל בפרקינסון לא רק בין חיפה לאשקלון ובאר שבע, אלא חייבת להיות



יותר מ-50% ממקרי המוות של חולי הפרקינסון המתרחש ים מדי שנה הם מחנק עקב בעיות בליעה, בשל חוסר נגישות לטיפול בבעיות בליעה. נתונים אלו הוצגו לרגל השקת השדולה למען חולי הפרקינסון, במטרה לעורר מודעות למחלה ולצרכים של החולים. בדיון שנערך בכנסת ביר

מחלקה ייעודית בכל בית חולים", הוסיפה ריקי נבון, מנכ"לית עמותת פרקינסון בישראל.

פרופ' אורן כהן, מנהל היחידה להפרעות תנועה באספ הרופא אומר כי פרקינסון היא מחלה כרונית וההתמודדות הן יומיומיות. "חולי פרקינסון זקוקים למעטפת של טיפולים משלימים ותומכים כל הזמן, לקשת רחבה של טיפולים, והקופות מגבילות את מספר הטיפולים שהחולים יכולים לקבל וזאת בעיה חמורה. ידוע שטיפולים אלה משפרים את איכות החיים ומאטים את התקדמות המחלה".

זמת עמותת הפרקינסון, צויין כי 100%-90% מהחולים סובלים מהפרעות בליעה ולמעלה מ-54% מחולי הפרקינסון נפטרים מדלקת ריאות על רקע בעיות בליעה. החולים סובלים גם מבעיות שיווי משקל קשות ונופלים פי 4 ממבוגרים בריאים בני גילם. הסיבה העיקרית היא היעדר תשתית טיפולית מספקת בבעיות בליעה, בעיקר בפריפריה.

עמיר כרמץ יו"ר עמותת פרקינסון בישראל, ציינה כי יש להכליל טיפולי פיזיותרפיה בסל הבריאות באופן שייתן מענה אמיתי לצורך של החולים, ולטפל באמצעות קלינאי תקשורת